

STUDIU Cum ar putea fi redusă la jumătate mortalitatea pacienților cu COVID-19

George-Andrei Cristescu,



O cercetare realizată de un grup de medici din Bologna arată că mortalitatea pacienților infectați cu COVID-19 ar putea fi redusă la jumătate. Un diagnostic precis și un tratament potrivit pot reduce considerabil mortalitatea.

Studiul medicilor italieni a fost realizat pe 301 pacienți de la Policlinica Sant'Orsola din Bologna și la el au contribuit specialiști din mai multe domenii: reanimare, pneumologie, radiologie, oncologie și statistică medicală, potrivit www.nurse24.it, citată de Libertatea.

Conform cercetării, SARS-CoV-2 poate afecta ambele componente ale plămânilor: alveolele, care preiau oxigenul și eliberează dioxidul de carbon, respectiv capilarele, vasele sanguine în care se produce schimbul dintre dioxidul de carbon și oxigen. Când virusul atacă doar una dintre aceste două componente, mortalitatea este de 20%, iar atunci când ambele componente sunt atacate, există o probabilitate de 60% ca pacientul să moară.

Dacă bolnavului de COVID-19 i se face un examen pulmonar, medicii pot să afle clar care sunt pacienții într-o situație de risc crescut.

În România, rata mortalității este crescută pentru că numărul de teste nu este încă suficient, iar anchetele epidemiologice se fac superficiale. Bolnavii sunt depistați târziu, iar astfel de analize amanuntite, precum cele la plămâni, sugerate de medicii din Bologna, nu se fac deloc sau se fac prea târziu.

„Studiul din Bologna indica rezultate care vor aduce urmări pozitive pentru tratamentul COVID-19, fie că vorbim de medicatii deja existente, fie de cele care vor fi realizate ulterior”, a spus subsecretarul de stat din Ministerul Sănătății Sandra Zampa pentru Bari Today, citat de aceeași publicație.
